

## 〈パージェタ840mg+HER8（大腸がん）〉インターバル:21日

### 注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day0	1	2	3	…	21
RP01	ペルツズマブ 生理食塩液	840mg <sup>*1</sup> in 250mL	60分		↓				
RP02	生理食塩液	100ml	60分		↓				
RP03	トラスツズマブ 生理食塩液	8mg/kg <sup>*2</sup> in 250ml	90分 <sup>*3</sup>		↓				
RP04	生理食塩液	50ml	30分		↓				

### 内服薬

	薬品名	投与量	投与日数	day0	1	2	3	…	21
RP1	アセトアミノフェン錠	500mg <sup>*4</sup>	1日分		↓				

\*1 初回840mg/body、2回目以降 420mg/body

\*2 初回8mg/kg、2回目以降 6mg/kg

\*3 初回90分、2回目以降忍容性が良好であると認められれば30分で可

\*4 初回はペルツズマブ30分前にアセトアミノフェン500mg内服

〈パージェタ420mg+HER6（大腸がん）療法〉 インターバル:21日

注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day0	1	2	3	…	21
RP01	ペルツズマブ 生理食塩液	420mg in 250mL	60分		↓				
RP02	生理食塩液	50mL	30分		↓				
RP03	トラスツズマブ 生理食塩液	6mg/kg in 250mL	30分 <sup>*1</sup>		↓				
RP04	生理食塩液	50mL	30分		↓				

\*1 初回投与时忍容性が良好でなかった場合、医師に投与時間を確認