

〈ドセタキセル/ハーセプチン〉

インターバル：21日

注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	…	8	…	15	…	21
RP01	デキサメタゾン 生理食塩液	6.6 mg in 100mL	30分	↓						
RP02	トラスツズマブ 生理食塩液	8mg/kg ^{*1}	90分 ^{*2}	↓						
RP03	ドセタキセル 生理食塩液	70mg/m ² in 250mL	60分	↓						
RP04	生理食塩液	50 mL	15分	↓						

内服・外用薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1	…	8	…	15	…	21
RP01	カロナール錠	500mg	1日分 ^{*3}	↓						

*1 初回8mg/kg、2回目以降 6mg/kg

*2 初回90分、2回目以降忍容性が良好であると認められれば30分で可

*3 トラスツズマブ投与30分前に内服

・適応条件：病理組織学的にHER2 IHCにて (3+) または (2+) かつDISH法で陽性
ドセタキセル併用×6コースまで

・ドセタキセル：75歳以上はドセタキセル 55 mg/m² へ減量

・ハーセプチン：LVEF ≧ 50% かつNYHA I

初回（1コース目）は入院治療

初回投与の認容性が良好であれば、2回目以降投与時間を30分まで短縮出来る

・体重50kg以下の場合、カロナール内服は10mg/kgに応じて用量調整

〈ハーセプチン（維持治療）〉

インターバル：21日

注射薬

	薬品名	投与量	点滴時間	day1	…	8	…	15	…	21
RP01	トラスツズマブ 生理食塩液	6mg/kg	30分	↓						
RP02	生理食塩液	50mL	15分	↓						

内服・外用薬

	薬品名	投与量	投与日数	day1	…	8	…	15	…	21
RP01	カロナール錠	500mg ^{*1}	1日分	↓						

*1 トラスツズマブ投与30分前に内服

- ・適応条件：病理組織学的にHER2 IHCにて (3+) または (2+) かつDISH法で陽性
ドセタキセル併用×6コース終了後の維持治療として
- ・ハーセプチン：LVEF \geq 50% かつNYHA I
初回（1コース目）は入院治療
初回投与の認容性が良好であれば、2回目以降投与時間を30分まで短縮出来る
- ・体重50kg以下の場合、カロナール内服は10mg/kgに応じて用量調整