

甲状腺アブレーション治療を受けられる患者さんへ（チラーヂンS休薬）




患者ID:

主治医:

担当医:

氏名:

受持看護師:

	検査準備期間 / ~ /	内服日 /	待機日 /	撮像日 /	再診日 /
目標	● 食事管理ができる ● 薬の内容を理解できる				
検査		8時30分に1階で再診受付 2階の検査部で採血後、 放射線治療室の待合で待機 昼頃にヨード治療薬を内服  1時間後に線量測定を行い、 問題なければ帰宅		8時30分に 1階で再診受付 PETセンターで 全身撮影 終われば帰宅	
内服薬		吐き気止め内服(2日間) 			
	#VALUE! ~ /	内服日の朝まで チラーヂンS 休薬		チラーヂンS 再開	
	チラーヂンS 以外のお薬は内服してかまいません				
	#VALUE! ~ #VALUE! チロナミン内服 14日間	#VALUE! 以降はチロナミン を内服しては いけません。内服し忘れたチロナミンがあっても、 内服をしてはいけません。		チロナミン内服 2日間	
食事	相談室で 栄養指導	#VALUE! ~ / ヨード制限食			
		昼食不可 ヨード内服3時間後からおやつ可		朝までヨード制限食 昼から普通食可	
安静度	制限なし	食後は30分安静 帰宅後は、外来で説明された行動 制限を遵守してください		制限なし	
説明					検査結果の説明
その他					紹介元の医師に 検査結果を報告

甲状腺アブレーション治療を受けられる患者さんへ (タイロゲン)





患者ID:

主治医:

担当医:

氏名:

受持看護師:

	検査準備期間	注射 /	注射 /	内服日 /	撮像日 /	再診日 /	
目標	● 食事管理ができる ● 薬の内容を理解できる						
処置		放射線科外来で タイロゲン 筋肉注射 		昼頃にヨード治療薬を内服  1時間後に線量測定を行い、問題なければ帰宅			
内服薬 		吐気止め(内服)(2日間)		吐気止め(内服)(2日間)			
	チラーヂンS 休薬なし						
検査				8時30分に1階で再診受付 2階の検査部で採血後、 放射線治療室の待合で待機	8時30分に1階で再診受付 PETセンターで全身撮影 終われば帰宅		
安静度		制限なし		帰宅後は、外来で説明された 行動制限を遵守してください 食後は30分安静		制限なし	
食事	相談室で 栄養指導	開始日 ~ 2週間 ヨード制限食					
				昼食不可 ヨード内服3時間後からおやつ可	朝までヨード制限食 昼から普通食可		
説明						検査結果の説明	
その他						紹介元の医師に 検査結果を報告	