

鼓室形成術を受けられる患者さんへ

	入院日・手術前日	(手術室に入るまで) 手術当日 (帰室してから)	術後1日目	術後2日目 ~ 術後4日目	術後5日目 ~ 退院日
目標	不安なく手術を迎えることができるように説明します	手術が円滑に行われるように準備します	痛みを十分にコントロールするように努めます	感染が生じないように努めます	手術創が落ち着けば退院について相談します
治療 処置	 静脈血栓を予防するため弾性ストッキングをはいて手術室へ行きます	マスクにて酸素を吸います 	酸素の吸入は朝で終了です 処置室にて創部のガーゼを交換致します	処置室にて創部のガーゼを交換致します	(手術後5日目) ドレーンが入っていれば抜きます (手術後7日目) 耳の中のスポンジを取り除きます
点滴 内服薬	持参された薬を一旦看護師に預けて頂きます 	午後から手術を受けられる方には、脱水を予防するために午前中から点滴があります	急変時に対応できるように点滴は翌朝まで継続します 感染予防のための抗菌薬と、痛み止めを点滴にて投与します	特に問題がなければ点滴は終了になります 抗菌薬や痛み止めは内服になります	
検査	血圧・脈・体温を測ります	血圧・脈・体温を測ります	血圧・脈・体温を測ります 聞こえ具合の検査を行います	血圧・脈・体温を測ります	
安静度	制限はありません	制限はありません	病棟に帰室後3時間はベッド上にて安静です	制限はありません	
食事	特別な制限はありません	朝食、昼食共に食べられません 飲水は、手術の開始予定時刻によって制限されます	帰室後3時間目から、水を飲むことができます 5時間目から、食事ができますよって、午前中の手術の方には夕食から配膳します 	午後の手術の方にも朝食から配膳します 	退院時の注意点 ・耳の中を触らないようにしてください ・耳たぶを引っ張ったり、後ろの創を触ったりしないでください
清潔	手術後から暫く洗髪はできませんので、今日中にお済ませください			点滴が外れると、首から下のシャワー浴ができるようになります 洗髪はドライシャンプーをお願いします	(術後5~7日目) 耳の後ろの創が落ち着けば洗髪ができるようになります 
排泄			麻酔中におしっこの管にクダが入ります 意識がしっかりすれば抜きます		
説明	耳鼻咽喉科および麻酔科の医師による手術の説明があります 手術・麻酔・入院の同意書の書類を作成します				
その他	全身麻酔にて手術を受ける方はT字帯を売店にて購入してください				