










ドセタキセル療法を受けられる患者さんへ

	入院日	投与日	投与2日～投与7日目	投与8日～投与13日目	退院日
目標	治療の必要性、スケジュール、合併症や副作用を理解できる	体温・脈拍・血圧が安定している 副作用が理解できる	体温・脈拍・血圧が安定している 副作用が理解できる		退院後の生活についてわからないことがあれば聞くことができる
治療処置		全身状態を観察するため、 点滴中は心電図モニターを装着します			
点滴		点滴をします (3時間程時間を要します)			
内服薬	持参された内服薬は一旦看護師が預かります 内服薬は、医師に確認します		通常通り、内服薬を飲んで下さい		
検査	身長・体重を測定します 採血・採尿・レントゲン・心電図の検査があります				
安静度	制限はありません	点滴中は、なるべく安静にして下さい	制限はありません		
食事		 制限はありません 食欲がない時は食事の内容を変えることができます。ご相談ください			
清潔		点滴前か後に、シャワー浴や体を拭くことができます	状態に応じて、清拭やシャワー浴ができます 入院中、できる限りシャワー浴をし身体を清潔に保ちましょう		
排泄			抗癌剤治療により便秘になることがあります 便の回数や硬さ、色、量を教えてください		
説明	<ul style="list-style-type: none"> * ご本人確認できるようにリストバンドをつけていただきます * 入院生活のパンフレットに沿って説明、病棟案内を行います * 入院診療計画書の説明を行います 署名をして看護師にお渡し下さい * 医師から点滴の説明を行い、同意書を頂きます。 「抗がん剤治療を受ける患者さんとご家族の方、抗がん剤治療当日の説明用紙」のパンフレット【特に、排泄の注意点(P.4)】をよく読み分からないところがあればお聞き下さい 	<ul style="list-style-type: none"> * 抗癌剤投与中、皮膚の症状(かゆみ、蕁麻疹)、息苦しさなど症状が生じやすいです 症状出現の際は、<u>すぐに</u>ナースコールを押してください * 点滴中に違和感が生じたら申し出て下さい * 点滴中に針が入っているところの赤み * 点滴が入っているところの痛み * 点滴の針が入っているところの腫れ * 投与日～投与後7日目に食欲不振・身体のだるさ・吐き気等があります 	<ul style="list-style-type: none"> * 副作用症状は個人差があります 症状が出現した場合には早めに看護師に相談してください * 便秘は抗がん剤投与3日目から1週間程度みられることがあります。一時的に下剤で調整をします * 骨髄抑制(免疫力低下・貧血・出血)は投与1週間目から2週間程度みられます。<u>病室から出るときは、マスクの着用、行動前後には手洗い・うがいをお願いします</u> * その他の副作用として、吐き気・身体のだるさ・頭痛・めまい・ふらつきなどが起こることがあります。<u>転倒に注意しましょう</u>  	<p>次回の来院日時を確認して下さい</p> <p>＼退院後の注意点について/ * 骨髄抑制(免疫力低下・貧血・出血)は投与1週間目から2週間程度みられます。外出の際は、<u>マスクの着用、行動前後には手洗い・うがい</u>をお願いします</p> 