








# カルボプラチン+ペメトレキセド療法を受けられる患者さんへ

	入院日	投与日	入院3日目～入院7日目	入院8日目～入院20日目	退院日
目標	治療の必要性、スケジュール、合併症や副作用を理解できる 	体温・脈拍・血圧が安定している 副作用が理解できる 治療に伴う症状に気づくことができ、知らせることができる 点滴のところに赤み・腫れ・痛みがない	体温・脈拍・血圧が安定している 副作用が理解できる 治療に伴う症状に気づくことができ、知らせることができる	体温・脈拍・血圧が安定している 副作用が理解できる 治療に伴う症状に気づくことができ、知らせることができる	退院後の生活について分からないことがあれば聞くことができる
治療処置		全身状態を観察するため、点滴中は心電図モニターを装着します		副作用症状に対して必要時治療を行います	
点滴		点滴をします (3時間以内に点滴が終わります) 		通常通り、内服薬を飲んで下さい 	
内服薬	持参された内服薬は一旦看護師が預かります 内服薬は、医師に確認します 痛み止めのお薬を服用されている方は5日ほどお休みにしていただくことがあります				
検査	身長・体重を測定します 採血・採尿・レントゲン・心電図の検査があります			身体の状態に応じて検査を行っていきます	
安静度	制限はありません	点滴中は、なるべく安静にしてください		制限はありません	
食事		制限はありません 食欲がない時は食事の内容を変えることができます。ご相談ください 			
清潔		点滴前か後に、シャワー浴や体を拭くことができます		状態に応じて、清拭やシャワー浴ができます 入院中、できる限りシャワー浴をし身体を清潔に保ちましょう 	
排泄				抗癌剤治療により、排便障害(便秘や下痢)になることがあります 便の回数や硬さ、色、量を教えてください	
説明	*ご本人確認できるようにリストバンドをつけて頂きます *入院生活のパンフレットに沿って説明、病棟案内を行います *入院診療計画書の説明を行います 署名をして看護師にお渡し下さい *医師が点滴の説明を行い、同意書を頂きます。 「抗がん剤治療を受ける患者さんご家族の方、抗がん剤治療当日の説明用紙」のパンフレット【特に、排泄の注意点(P.4)】をよく読み分からないところがあればお聞き下さい 	*抗癌剤投与中、皮膚の症状(かゆみ、蕁麻疹)、息苦しさなどアレルギーが生じやすいですが、その他にもいろいろな症状があるため何か変わったことがあればすぐにナースコールを押してください *カルボプラチンは血管から漏れた時に赤みや腫れ、痛み、熱が出てくる場合があります。 点滴中に違和感が生じたらナースコールを押して下さい ・点滴中に針が入っているところの周囲の <b>発み</b> ・点滴が入っているところの <b>痛み</b> (ピリピリした感じ) ・点滴の針が入っているところの <b>腫れ</b> (違和感) *投与日～投与後7日目に起こりやすい副作用として食欲不振・身体のだるさ・吐き気等があります <b>転倒に注意しましょう</b> 	*副作用症状は個人差があります *投与後5日目～投与後3週間頃の起こりやすい副作用として吐き気・身体のだるさ・めまい・ふらつきなど起こる事があるので、 <b>転倒に注意</b> しましょう *骨髄抑制(免疫力低下・貧血・出血)は投与1週間～3週間程度みられます。病室から出るときは、 <b>マスクの着用、行動前後には手洗い・うがいをお願いします</b> *投与1日目～2・3週間の内に <b>髪の毛が抜け始める事</b> があります。治療の点滴が終わってから3～6ヶ月でまた生えてきますがウィックなどで希望される際は <b>カタログをご案内いたします</b> *投与1日目～2週間頃から <b>手足のしびれ</b> が出てくる事があります。しびれの症状がある際は、医師や看護師にお知らせ下さい	*次回の来院日時を確認してください *外出の際は、 <b>マスクの着用、行動前後には手洗い・うがい</b> をお願いします 