

心臓カテーテル検査を受けられる患者様へ（ 橈骨動脈穿刺 ）

※検査・治療内容によって時間が前後する場合があります。

	検査前日	検査当日		検査後1日～2日後
		（検査前）	（検査後）	
目標	検査について理解できる	穿刺部に問題が無い 胸部症状・所見がない バイタルサインが安定している		穿刺部に問題が無い 胸部症状・所見がない バイタルサインが安定している 急激な腎機能低下がない
点滴 内服 処置	動脈の触れを確認するために、 マジックで印をつけます 内服： インスリン： 点滴： 	検査前より点滴を行います (前日から点滴をする方もいます) 検査当日、抗生物質の内服または点滴があります 内服： インスリン： 	手首に添えた板は、帰室して3時間後に看護師がのけます バンドは医師が徐々に緩めて行きますので、自分でのけないようにして下さい	翌朝に医師がバンドをのけます 
検査	検査前日に入院の方は、採血、レントゲン、心電図、血圧脈波などの検査があります			採血などの検査があります
活動	特に制限はありませんが、看護師の指示に従って下さい	肌着を脱いで、ガウンタイプの病衣に着替えます 検査前に、眼鏡・時計・義歯・アクセサリー・化粧をはずして下さい 車いすで看護師と一緒に検査室に行きます	検査終了後、刺した部分を止血のためにバンドで圧迫固定します 手首はできるだけ曲げたり、体重をかけたりしないでください 検査後翌日まではトイレに行く位にしてください	元の安静度に戻ります
食事	病院食を摂取して下さい	朝食： 昼食： 夕食： 	帰室後、状態が落ち着いていれば水分や食事の制限はありません 造影剤を排出するために水分は多めにとってください (ただし水分制限がある方は制限内で摂取して下さい)	病院食を摂取して下さい
清潔	入浴可能な方は、入浴、シャワー浴をお済ませ下さい			入浴・シャワー浴可能です
排泄		検査前に排尿をすませてください		
その他	医師より検査の説明後、同意書をお渡しします サインをしてナース・ステーションまで提出して下さい その他分からないことがありましたら、お尋ね下さい		バンドできつく締めるので、指が動かない・痺れる、きつすぎて痛い場合は、すぐにお知らせ下さい また、穿刺部が腫れてきたり、出血してきた場合もすぐにお知らせ下さい その他、胸・頭が痛い、気分が悪いなど、体調に変化がある場合も、すぐにお知らせ下さい	