


S-ICD植え込み術を受けられる患者様へ

	手術前日	手術当日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
目標	手術・麻酔の内容、術後の安静について理解できる	痛みがない 安静が守れる 不整脈の症状がない	安静が守れる・感染の所見がない・痛みがない 退院後の生活の注意点などが理解でき、不安がない							感染の所見がない 創部にも問題がない ペースメーカー作動が順調
検査		 採血・尿検査・胸部レントゲンなど								S-ICD チェック 
安静度	院内で 制限ありません	止血のため術後4時間は、ベッド上で安静（ギャッジ30度可） 以後、室内で制限なく、トイレ歩行可	棟内で 制限ありません 							院内で 制限ありません 
清潔	入浴可	早朝に入浴・洗髪 術後は入浴不可	清拭	下半身シャワー可・上半身は清拭				全身シャワー可 		
排泄	トイレ歩行可	手術室にて尿の管を入れます 止血確認後に尿の管は抜きます	トイレ歩行可							
食事	通常	朝食： 昼食： 夕食： 帰室3時間後より、ムセ込み等の確認を行って食事再開となります	通常 							
内服 ・ インスリン	内服： インスリン：	内服： インスリン：	基本的に通常通りとなりますが、他の検査により変わる場合もあります							
点滴		■ 術当日の入浴後より点滴をします ■ 止血確認後に点滴を抜きます ■ 抗生剤の投与があります								
その他	剃毛をします 心電図モニターを付けます 	義歯、眼鏡、時計等は外していきます  血栓予防のため、弾性ストッキングを装着します	■ 術後創部はガーゼで圧迫し、テープで固定します ■ 医師が毎日創部の確認を行います 看護師から、パンフレットによる指導があります 							心電図モニターを外します 創部にはっているステリーテープは、自然にはがれるまで外さないでください
創部の痛みや腫れ、しびれがある時や、胸痛や動悸などの胸の症状、気分が悪いときなどは、すぐに教えて下さい										