

化学療法(ドキシル・ドセタキセル・アドリアシン)ユニットを受けられる方へ

	入院日	治療当日 	2日目	3日目	4日目	退院日
目標	治療の内容が分かる。 治療に伴う症状に気づくことができ、知らせることができる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 薬に対してアレルギー症状がない。 点滴のところに赤み・腫れ・痛みがない。 治療に伴う症状に気づき、知らせることができる。	体温・血圧・脈拍が安定している。 治療に伴う症状に気づき、知らせることができる。			体温・血圧・脈拍が安定している。 治療に伴う症状に気づき、知らせることができる。 日常生活の注意点について分かる。
説明	入院生活、化学療法について、また副作用のケアについて説明します。 初回の治療時はパンフレットを使用しながらお話しします。 記入の必要な書類は早めに持参して下さい。 				退院後の生活について説明します。	医師より退院後の外来受診などについて説明があります。 
検温	1回	6時、10時、14時、19時	6時、14時		14時	
排泄	トイレまで歩行できます。	トイレまで歩行できます。 点滴中の歩行は、転ばないように注意しましょう。	トイレまで歩行できます。			
処置		9時頃に医師が点滴の針を入れ点滴が始まります。 抗がん剤の点滴中は、心電図を付けます。 ドキシルとアドリアシン点滴中は、副作用を防ぐために、手首と足首をアイスノンで冷やし、口の中に氷を含んで冷やします。 ドセタキセル点滴中は、副作用を防ぐために、手首と足首をアイスノンで冷やします。 点滴中腕が腫れたり痛みを感じる時や、普段と違う症状が出たら、すぐにナースコールを押してください。	眠れない時、気持ちが悪い時、便秘の時などは、必要に応じお薬の使用ができます。 水分は多めに摂るように心がけましょう。 1日に1000～1500mlが目安です。			血液・尿検査をします。
内服	内服されているお薬の確認を行うため、お薬は全て看護師にお渡しください。					
安静	制限はありません。	点滴中は病棟内のみ歩行できます。	制限はありません。			
食事	制限はありません。	食べられる時に食べられるものを食べるようにしましょう。 食事が食べられない時は食事変更ができますのでご相談ください 				
清潔	シャワー浴可能です。	点滴中のためシャワー浴は出来ません。	シャワー浴可能です。			