エコーガイド下神経ブロック

Ultrasound guided nerve block

SonoSite M-turbo

プローブ選択ボタン

プリンタ

プローブ選択

- ◆ 周波数；高周波は浅部
- ◆ 素子配列；リニアは浅部、コンベックスは深部
- ◆ 接触面積；場所に応じて

プローブ操作

プローブ操作

- ◆ しっかり押し当てる
静脈を見るときは押し当てる強さを変える
- ◆ プローブを持つ手は患者やベッドに置いて固定
- ◆ 入射角と標的の角度が90度のとき最適画像

2. The Impact of Transducer /Beam Angle on Needle Imaging

1. The Impact of Transducer Angle on Nerve Imaging

The transducer is scanning at a 90 degree angle.

The transducer is scanning at a 75 degree angle.

The transducer is scanning at a 45 degree angle.

コンパウンド超音波断層法

◆ 送信角度を変化させて画像を合成

→音響アーチファクト減少

→入射角度の影響を受けにくい

→組織境界を明瞭に描出できる

Supraclavicular Region (10 MHz Transducer, 3 cm Depth)

No Cross Beam (No Compound Imaging)

Cross Beam (Compound Imaging)

針の刺入と描出

平行法 in plane

直交法 out of plane

局所麻酔薬注入

- ◆ 神経の周囲に注入する、神経内に入れない
ドーナツサイン

D. Sonogram demonstrating proper local anesthetic (LA) around the femoral nerve (N).

局所麻酔薬注入

- ◆ 筋層間に入れる

Figure 8 Injection **above** the fascial plane separating the internal oblique and transversus abdominis muscles. (Image courtesy of Dr. Victor Chee)

超音波ガイド法の利点？

- ◆ ブロックの成功率向上
- ◆ 作用発現時間短縮、効果持続時間の延長
- ◆ 局所麻酔薬の必要量の減少
- ◆ 困難な状況でのブロック
- ◆ 血管内や神経内への誤注入の回避

いずれも結論は出ていない
安全性、確実性を保証するものではない

体表ランドマーク法

- ◆ 体表解剖から神経走行を類推する従来の方法
- ◆ 超音波ガイドを補助的に使うのは誤り
 - 針の方向を決めた後に神経を描出するのは困難
 - 超音波ガイド法では神経描出後に針の方向が決まる

超音波ガイド法と体表ランドマーク法
針の刺入部位・方向は全く異なる

参考サイト

- ◆ The New York School of Resional Anesthesia (NYSORA)
当初はclassical technique のみ
→最近、ultrasound-guided techniqueも充実
サイトの構成がやや複雑で探しにくい
- ◆ Ultrasound for Resional Anesthesia (USRA)
University of Toronto の麻酔科が運営
動画は少ないが、構成がまとまっている
- ◆ SonoSite, E-Lerning
動画が豊富