

〈FOLFIRI+ベバシズマブ療法〉

インターバル:14日

注射薬

| | 薬品名 | 投与量 | 点滴時間 | day1 | … | … | … | 14 |
|---------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|------|---|---|---|----|
| RP01 | ベバシズマブ 生理食塩液 | 5mg/kg in 100mL | 90分*1 | ↓ | | | | |
| RP02 | パロノセトロン デキサメタゾン ホスネツピタント | 0.75mg 6.6mg 235mg | 30分 | ↓ | | | | |
| RP03 | 生理食塩液 | 50mL | 15分 | ↓ | | | | |
| RP04 | レボホリナートCa ブドウ糖液 5% | 200mg/m ² in 100mL | 120分 | ↓ | | | | |
| RP04と 同時投与 | イリノテカン ブドウ糖液 5% | 180mg/m ² in 500mL | 90分 | ↓ | | | | |
| RP05 | フルオロウラシル 生理食塩液 | 400mg/m ² in 30mL | 500mL/min | ↓ | | | | |
| RP06 | 生理食塩液 | 50mL | 10分 | ↓ | | | | |
| RP07 | 生理食塩液 | 10mL | 10分 | ↓ | | | | |
| RP08 | フルオロウラシル 生理食塩液 | 2400mg/m ² total 80mL | 46時間*2 | ↓ | | | | |
| RP09 | ヘパリンNa(100U/mL) | 10mL | ワンショット 静注 | | | | | |

*1 初回90分、忍容性が良好であると認められれば、2回目60分、3回目以降30分可

*2 シュアビューザーA 2日用100mL 使用