右~S状結腸切除を受けられる患者さまへ

病日	入院日	手術2日前	手術前日	(手術前) 手術	当日 (手術後)	術後1日目	術後2日~6日目	術後7日目	術後8日目	術後9日目以降
目標	安心して手術を受けることができる。			ハイブルリインが女足している。		痛みがなく過ご すことができる。 リハビリができ る。	痛みがなく過ごす事が出来る。 リハビリができる。	痛みがなく過ご すことができる。 リハビリができ る。		栄養について 理解できる。
処置検査			寝る前にも下剤を飲	時 分手術室に 向かいます。 時浣腸をします 手術室に入る30分程 前に手術衣に着替 え、 血栓予防のストッキン グを履きます。	八つています。 ご自分で触ったり抜い	採血やレントゲ ン検査がありま す。	採血やレントゲン検査があります。	採血やレントゲ ン検査がありま す。	3	
注射点滴	#C41) @				持続的に点滴をします。					点滴は夕方 終了します。
治療	持参された内服薬は一旦看護師に預けて頂きます。				 心電図モニターをつけ ます。 					
水分食事	制限はありませ	ん。		朝から絶食です。 (水分は 時まで 飲むことができます)		水分と内服薬が 開始になります。	術後3日目から食事が開始になります。 三分粥から徐々に食事形態があ がっていきます。			
説明指導	四息音で内保に関いて頂きます。			手術に行く前は身に つけている貴金属を 外しておいてください。 (めがね、指輪、義 歯、ピップエレキバン など)		廊下を午前・午 後と歩行します。				
活動	安静度に制限はありません。			60						
清潔	制限はありませ	<i>λ</i> 。				身体を拭きます。	身体を拭きます。	看護師介助のも とシャワー浴が できます。		
その他	付き添いなど希	望がありました。	ら申し出てください。							