


HbA1cのコントロール

抗糖尿病薬服用患者さんのHbA1cコントロール

通院患者さんで、HbA1c<7.0% のコントロール患者の比率



測定方法


【分子】

該当期間中に、HbA1cの最終値が、7.0%以下の患者

【分母】

インスリン製剤または経口血糖降下剤を3カ月以上処方されている患者

通院患者さんで、HbA1c<6.5% のコントロール患者の比率



糖尿病薬のHbA1cコントロール率

HbA1c<7.0% のコントロール患者の処方薬比率

比率	アクト ス錠	アマ リール	ベイス ン	ジメリ ン錠	オイグル コン錠	ファス ティック錠	グリミ クロン	グルファ スト錠	グリコ ラン錠	トルブタ ミド	セイブ ル錠	スター シス錠
1983年				25.0	23.8					0.0		
1984年				36.0	7.1		27.3			0.0		
1985年				24.0	30.0		45.8			0.0		
1986年				16.7	23.4		32.3			12.5		
1987年				21.4	23.0		32.7			42.9		
1988年				20.0	20.3		31.1			25.0		
1989年				33.3	18.8		28.1			100.0		
1990年				12.5	21.0		32.5			75.0		
1991年				42.3	23.4		41.1			66.7		
1992年				46.2	21.4		36.1			25.0		
1993年				26.1	27.3		27.2			40.0		
1994年				33.3	16.0		15.3	15.7		33.3		
1995年			22.7	11.1	12.8		17.6	9.6		0.0		
1996年			43.9	52.4	35.9		47.4	37.1		50.0		
1997年			44.4	47.1	36.4		37.9	45.3				
1998年			42.0	50.0	32.9		42.3	41.8				
1999年			43.8	58.8	36.9		42.1	47.1	25.0			
2000年	47.8	68.8	58.9	71.4	48.2	100.0	56.1	47.5	28.6			85.7
2001年	43.8	39.3	48.5	71.4	41.6	83.3	53.3	57.9	38.1			69.2
2002年	51.5	43.8	52.3	42.9	46.2		54.5	47.8	51.1			69.2
2003年	37.2	51.0	54.1	85.7	40.0		63.2	47.1	38.8			82.4
2004年	46.2	48.2	49.1	85.7	42.4		66.7	50.0	41.3			70.6
2005年	43.3	46.4	53.7		35.5		56.9	49.4	40.7			62.0
2006年	53.1	54.9	63.7		56.1		70.0	57.1	49.2	100.0		58.8
2007年	63.5	61.9	65.8		57.9		72.9	61.0	46.5	48.3		64.4
2008年	62.8	59.1	64.4		60.9		76.0	65.1	55.4	72.4		75.0
2009年7月まで	57.7	63.9	69.7		50.0		72.7	73.5	54.2	59.1		80.6

測定方法

【分子】

分母対象例でHbA1cが<7.0%の患者数

【分母】

薬剤（インスリン製剤または経口血糖降下剤）別処方患者数

