

新規ICD・CRT-D植え込み術(除細動試験あり)



	手術前日	手術当日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	
目標	手術、麻酔の内容、術後の安静について理解できる	痛みがない 安静が守れる 不整脈の症状がない	安静が守れる・感染の所見がない・痛みがない 退院後の生活の注意点などが理解でき、不安がない							感染の所見がない 創部にも問題がない ペースメーカー作動が順調	
検査		採血・尿検査・胸部レントゲンなど							ペースメーカーチェック		
安静度	院内フリー	止血のため術後4時間は ベッド上安静 以後、室内フリー・トイレ歩行可	棟内フリー						院内フリー		
←-----ペースメーカーが入っている側の upper limb は、1ヶ月間は肩より上に挙げない-----→											
清潔	入浴可	午前中に入浴・洗髪 術後は入浴不可	清拭	下半身シャワー可・上半身は清拭				全身シャワー可			
排泄	トイレ歩行可	尿の管を入れていきます 止血確認後に尿の管は抜きます	トイレ歩行可								
食事	通常	術当日の朝は絶食・昼は遅食です 術後より食事再開となります、水分を多く取ってください									
内服 ・ インスリン	内服・・・ インスリン・・・	内服・・・ インスリン・・・	基本的に通常通りとなりますが、他の検査により変わる場合もあります								
		術後創部の痛みがある時は、痛み止めの処方がありますので、我慢しないで下さい									
点滴		■ 術当日の入浴後より点滴をします ■ 止血確認後に点滴を抜きます ■ 抗生剤の投与があります									
その他	心電図 モニターを 付けます 	病衣に着替えます 義歯、眼鏡、時計等は外します	■ 術後創部はガーゼで圧迫し、テープで固定します ■ 医師が毎日創部の確認を行います						心電図モニターを外します		
		血栓予防に、弾性ストッキングをはいていきます	看護師から自己検脈とパンフレットによる指導があります						創部にはっているステリーテープは自然にはがれるまで外さないようにしてください		
創部の痛みや腫れ、しびれがある時や、胸痛や動悸などの胸の症状、気分が悪いときなどは、すぐに教えて下さい。											